

小兒疝氣-印尼語

Hernia pediatric

一、前言：

腹股溝疝氣即俗稱的「墜腸」，是因為腹腔構造發育不完全而導致腸內容物掉入腹股溝或陰囊因此形成疝氣。小兒的腹股溝疝氣幾乎都是先天性的間接型腹股溝疝氣，100個兒童約3個人有疝氣，男女生都會發生，但男生發生的機會約為女生的5到8倍。早產兒發生的機會更高，可達30%。根據統計，腹股溝疝氣發生在右側的機率較高，約占55%，左側約30%，兩側都有疝氣者占15%。10%的病人有家族史。三分之一的病人發病是在6個月大之前。

如果此發育的不成熟未造成疝氣，也可能因此使腹水流入，而形成陰囊水腫。二者均為兒童外科常見且最常施行手術的疾病，處理方式也很相近。

kata pengantar : hernia inguinalis umumnya dikenal sebagai,(usus turun) karena perkembangan struktur rongga perut yang tidak lengkap sehingga kandungan usus masuk ke selangkangan atau skrotum sehingga membentuk hernia. hampir semua Hernia inguinal pada anak-anak adalah bawaan tidak langsung hernia dari rongga inguinalis,dari 100 anak-anak di perkirakan ada 3 anak yang terjangkit hernia,laki”atau perempuan juga bisa terjangkit, tapi kemungkinan anak laki-laki sekitar bisa terjangkit lima sampai delapan kali lipat dari anak perempuan, Bayi prematur memiliki kesempatan lebih tinggi terjangkit, Sampai dengan 30%. Menurut statistik, semakin tinggi probabilitas pada hernia inguinalis kanan, sekitar 55% sampai 30% kiri, kedua belah pihak sebesar 15% hernia dan 10% adalah keturunan dari keluarga,seper3%pasien hernia, terjangkit saat sebelum berumur 6 bulan.

Jika perkembangan kurang baik tidak akan menjadi hernia,karena bisa saja berupa air dan mengalir ke perut,dan akan terjadi pembengkakkan pada kantong rahim,

Keduanya merupakan operasi umum dan paling umum dalam operasi anak-anak,dan cara penanganannya pun hamper sama.

二、常見的症狀：gejala yang sering di temukan：

※通常是在哭鬧、咳嗽、用力解便或運動後，在腹股溝處出現一個鼓起的無痛性塊狀物，

有時會延伸至陰囊；有可能在臥床休息或睡覺後自行消失。

※嚴重者將出現腹痛、噁心、嘔吐、厭食或哭鬧不安等現象。

※局部以手觸摸此鼓起的塊狀物，會有柔軟、滑溜的感覺。

※biasanya suka menangis,batuk,BAB sangat sulit,atau sehabis olah raga,terdapat bentuk benjolan kecil yang tidak sakit di selangkangan, dan juga meluas ke rahim mungkin juga bisa hilang dengan istirahat,dan tidur di kasur.

※Jika yang parah bisa terjadi sakit perut,mual,muntah,nafsu makan menurun dan menangis atau tidng tenang.

※Jika di sentuh benjolan di selangkangan itu akan,terasa lembek lembut dan licin.

三、治療方式：cara pengobatan：

一經發現應儘快就醫，治療的方法只有手術才可解決。

Setelah ditemukan harus sesegera mungkin mencari perawatan medis, pengobatan hanya bisa diatasi dengan operasi

參考資料


外科部小兒外科主治醫師 林文熙·小兒腹股溝疝氣·台大醫院 電子健康報·2014 年 05 月 78 期 引自 http://epaper.ntuh.gov.tw/health/201405/child_1.html

劉雪娥 總校閱(2010)· 成人內外科護理(下冊) 臺北：華杏。

臺大醫院教學部暨外科部主治醫師 葉啟娟(無日期)·疝氣要警覺，小心腸壞死！·財團法人全民健康基金會·健康醫學資訊·2016 年 4 月 23 日引自

http://www.twhealth.org.tw/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=808&Itemid=12

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang hal di atas, silakan hubungi kami05-2756000 tekan 40,ruang pasien tekan 4001、4002

天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2018 年 04 月修訂