

การอบรมทักษะการดูแลสุขภาพ  
บุคลากรทางการแพทย์ชาวต่างชาติในเทศมณฑลเจียอี้

## การดูแลบาดแผลต้องระวังการใช้ยา คำแนะนำสำหรับการดูแลพยาบาลบาดแผลที่บ้าน

ป้องกันการติดเชื้อและรักษาบาดแผล  
ปฏิบัติตามดูแลพยาบาลบาดแผลที่ถูกต้องตามวัฒนธรรม!



### การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้

- ผ้าเย็บพันแผลหรือเทปแผ่นดังแมลงกระหน่ำอากาศ
- เบตาเดินชนิดละลายน้ำได้
- สำลีก้านปลอกดเชื้อ


- น้ำเกลือปลอกดเชื้อ
- ผ้าก๊อชปลอกดเชื้อ
- ยาน้ำ/ยาทา



### ขั้นตอนการเปลี่ยนยา

- ล้างมือให้สะอาด
- เมื่อเปิดผ้าก๊อชปีดแผลออก ให้ชุบน้ำยาน้ำเกลือและค่อย ๆ เปิดออก (**ดูรูปที่ 1**)
- สังเกตขนาดของแผล สีของสารคัดหลัง รวมถึงมีอาการแดง บวม แสบ ปวดหรือมีกลิ่นที่ไม่ปกติหรือไม่
- จุ่มสำลีก้านลงไปในน้ำเกลือแล้วห่อทำความสะอาดโดยวนเป็นวงกลมจากบาดแผลสู่รอบนอก (**ดูรูปที่ 2**)
- จุ่มสำลีก้านในเบตาเดินแล้วซ้ำเข้าชื่อโดยหวานเป็นวงกลมจากบาดแผลสู่รอบนอกประมาณ 30 วินาที  
จากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือ (**ดูรูปที่ 2**) ถ้ามียาทาหรือยาน้ำให้ใช้ทำความสะอาดแผลด้วยวิธีเดียวกัน
- ปิดแผลโดยใช้ผ้าก๊อชและเทปผ้าพันแผลปิด 4 ด้าน<sup>ค้าบาดแผลอยู่บริเวณข้อต่อ ให้ระมัดระวังความสะอาดในการเคลื่อนไหว</sup>

รูปที่ 1



รูปที่ 2



(เช็ดบริเวณโดยรอบบาดแผล 5 เซนติเมตร ห้ามเช็ดไปมา)

### \* ข้อควรระวัง

- รักษาบาดแผลให้แห้งและสะอาด เพิ่มการรับประทานโปรตีนและวิตามิน C เพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น  
แนะนำให้ลดการรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและลดบุหรี่และแอลกอฮอล์
- หากมีอาการแดง บวม แสบ ปวดหรือมีการหลังสารคัดหลังเพิ่มขึ้นหรือมีกลิ่นที่ผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที
- ห้ามกดทับแผลเป็นเวลานาน ควรพักผ่อนและเปลี่ยนท่าทางอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
- หากมีสารคัดหลังซึมออกมากจากเทปพันแผลมากขึ้น สามารถเปลี่ยนผ้าก๊อชและเทปพันแผลได้เสมอ
- ควรล้างมือก่อนและหลังการทำแผล



รัฐบาลห้องศัลย์เทศมณฑลเจียอี้ สำนักงานสาธารณสุขเทศมณฑลเจียอี้~ห่วงใยคุณ~



โฆษณา

# 傷口照顧 藥注意

## 居家傷口換藥護理指導

預防感染，促進傷口癒合。  
正確傷口護理跟我做！





### 準備用物

- 無菌紗布
- 宣拉膠布或透氣膠帶
- 無菌生理食鹽水
- 藥水/藥膏
- 水溶性優碘
- 無菌棉棒



### 換藥步驟

1. 洗淨雙手。
2. 移除覆蓋在傷口上的紗布時，可用生理食鹽水沖濕，再輕輕取下。（如圖示1）
3. 觀察傷口大小、分泌物顏色，是否有紅、腫、熱、痛或有異味等。
4. 將棉棒沾取生理食鹽水，以傷口為中心往外環形清潔（如圖示2）。
5. 棉棒沾取優碘，以傷口為中心往外環形消毒約30秒後，再以生理食鹽水擦拭乾淨（如圖示2），若有藥膏或藥水以同樣方式擦拭。
6. 將紗布覆蓋在傷口之上，用膠布貼合四周，若傷口在關節處，須留意活動度。



### ※注意事項

1. 保持傷口乾燥與清潔，並增加蛋白質及維生素C攝取，以利傷口癒合；建議減少食用刺激性食物及菸酒。
2. 傷口有紅、腫、熱、痛及分泌物變多或是有異味等，應立即回診追蹤治療。
3. 勿長期壓迫傷口，至少2個小時翻身擺位一次。
4. 傷口敷料分泌物多時，請隨時更換。
5. 換藥前後應洗手。

### 參考資料

嘉義縣衛生局/嘉義縣推動國照護技巧文宣~外籍看護攏ㄟ通/資料來源：長期照護科/  
上版日期：112-02-08 [https://cyshb.cyhg.gov.tw/News\\_Content.aspx?n=2849&s=292142](https://cyshb.cyhg.gov.tw/News_Content.aspx?n=2849&s=292142)