“應元” 蓖麻子油 Castor Oil

OLEUM RICINI “Y.Y.” 30ml/Bot

大腸鏡檢 / 腹部 X 光檢查使用說明書

【服用方法：建議空腹使用，搭配足量開水】

步驟一：蓖麻子油純天然無添加任何賦形劑，冰箱冷藏一小時即可降低油感，適口性佳

步驟二：請先準備250c.c紙杯倒入冷藏30c.c.蓖麻子油，再擇一加入如蘆筍汁、舒跑、沙士、甘蔗汁、椰子汁、柳橙汁、蜂蜜水，攪拌即可飲用適口性佳。

☐ 上午檢查者	☐ 下午檢查者
1. 檢查前二天：低渣飲食開始 2. 檢查前一天下午 3 點以後，無渣飲食開始 3. 檢查前一天下午 **3** 點： 第 1 瓶蓖麻子油伴隨無渣飲品 250c.c 服用 請觀察排便次數約 2-3 次，若糞便呈現糞渣狀，請先多補充水大約 1000c.c.，**腸道清潔過程中請多走動、按摩腹部促進排便**。 4. 檢查前一天晚上 **7** 點： 第 2 瓶蓖麻子油伴隨無渣飲品 250c.c 服用 5. 最後排出糞便須呈淡黃透明澄清狀才是最佳清腸。若排出液仍有雜質，請於晚上 12 點前繼續喝水， 直到排出液呈澄清水狀。 6. 檢查當日早餐禁食	1. 檢查前二天：低渣飲食開始 2. 檢查前一天晚上 7 點以後，無渣飲食開始 3. 檢查前一天晚上 **7** 點： 第 1 瓶蓖麻子油伴隨無渣飲品 250c.c 服用 請觀察排便次數約 2-3 次，若糞便呈現糞渣狀，請先多補充水大約 1000c.c.，**腸道清潔過程中請多走動、按摩腹部促進排便**。 4. 檢查前一天晚上 **11** 點： 第 2 瓶蓖麻子油伴隨無渣飲品 250c.c 服用 5. 最後排出糞便須呈淡黃透明澄清狀才是最佳清腸。若排出液仍有雜質，請繼續喝水，直到排出液呈澄清水狀。 6. 體力不支者，中餐可飲用無渣飲品
※服用後也可依需要併用 Bisacodyl Suppository，請由專科醫師判斷	



【檢查前飲食注意事項】

1. 檢查前 2 天請用低渣飲食：米飯、麵包、饅頭；去皮的魚肉、絞肉、肉鬆、豆腐或清流質飲食，魚湯或粥湯、運動飲料或濾渣果汁)，前 1 天依時間請用無渣飲食，以免影響清腸藥劑之飲用及腸道清潔效果。

2. 檢查前 2 天不宜進食：青菜、水果等高纖食物及不可食用牛奶、豆漿及其他乳製品，產生糞便多，影響清腸藥劑之飲用及腸道清潔效果。

【其他注意事項】

1. 因個人體質或有習慣性便秘者，排便作用時間可能延後，建議服藥後多喝水多起身走動。

2. 多次排便因擦拭可能造成肛門不舒適感，建議改用濕紙巾或溫水沖洗乾淨；亦可塗抹凡士林等潤滑劑改善。

【檢查當日準備】

1. 清腸藥水開始飲用後，若發生低血糖現象，可用方糖或運動飲料來補充，降低不適。

2. 檢查當日穿著寬鬆衣褲，請勿配戴金屬、貴重物品。

3. 術前與醫師充分溝通自身相關疾病及用藥、飲酒狀況，以利醫師檢查前之評估。

4. 若選擇麻醉無痛的檢查方式，建議要有親友家屬陪同或要等 麻藥全退後才可以離開醫療院所保障安全。

【有服用慢性病用藥者】

※ 建議有慢性病的人，應於術前與醫師充分溝通了解，用藥的劑量、時間點是否需要調整。

慢性病常規用藥，可於檢查當日攜帶於身邊，待可以服用時再服用。

※ 建議相關疾病史、藥物過敏史、用藥情形應於檢查前與醫師詳細溝通討論。

1. 高血壓：檢查當天早上 7:00 可以服用降血壓藥物。(若為利尿劑型，則於檢查後服用)

2. 糖尿病：檢查當天早上切勿服用糖尿病口服藥及 insulin。檢查前一晚的用藥劑量應與醫師充分溝通。

3. 抗凝血劑：檢查前請與醫師討論溝通，一般於檢查前 3~5 天暫停服用。

   因做腸胃鏡可能加做息肉切除手術(電燒息肉切除、黏膜切除術)，若您有服用 Aspirin、 Clopidogrel (Plavix)、Warfarin (Coumadin)等抗凝血藥物，請您於檢查前與開藥之專科醫師確認是否能停藥。

   - **Aspirin** -停藥 5 天
   - **Clopidogrel (Plavix)**-停藥 7 天
   - **Warfarin (Coumadin)** -停藥 7 天

   如無法停藥，則不建議加做息肉切除手術

4. 有心臟、腎臟疾病史的患者，必須要告知醫師，以利醫師選擇合適的藥物及檢查方式。

5. 對於心肌梗塞、嚴重心律不整、COPD、心衰竭、重症肌無力等病患，除非病情需要，否則不可接受無痛內視鏡檢查。

本資料僅供專業人士參考
不得轉為他用

PIC/S GMP
應元化學製藥股份有限公司
台灣台南市安平工業區新忠路26號TEL:06-2654883(代表號)
諮詢專線：0800-635080

若您想對以上內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000

轉 70 病房分機 7001、7002

8 樓生理檢查中心分機 3502、3503