


胸腔引流照護事項



胸腔引流是什麼？我該注意什麼？

◆ 胸腔引流的目的是

- ✓ 協助排出異常液體（血、膿、氣）
- ✓ 減少肺部壓力，恢復呼吸功能
- ✓ 可進行藥物注射治療

◆ 院期間我需要注意什麼？

✓ 正確做法	⊘ 錯誤行為
✓ 引流瓶放低於胸部60公分	⊘ 放得太高或瓶身傾斜
✓ 管路不可扭結、拉扯	⊘ 管路被壓到、打結或摺曲
✓ 輕輕咳嗽促進恢復	⊘ 壓迫胸口或穿太緊衣物
✓ 行動時請由家屬協助	⊘ 自行行走拉扯導管

管路不可扭結、拉扯



◆ 衛教小測驗

- 胸腔引流瓶應放在胸部高度或以上，以利引流順暢。
- ✗ 錯誤：應放置低於胸部60公分
- 若發現管路脫落、翻倒，應立即通知護理師
- ✓ 正確：是異常警訊。

重要!



◆ 異常警訊有哪些？

- 傷口紅腫、疼痛、滲液變多
- 每小時引流超過100c.c.
- 液體呈濃黃、紅褐、惡臭
- 管路脫落、滑脫或有空氣聲

參考資料：Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing (15th ed., Vols. 1-2). Wolters Kluwer.

天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院

諮詢電話7501、7502

2025年6月.第二版