

四、妊娠糖尿病的血糖控制目標

妊娠糖尿病		懷孕前已罹患糖尿病	
	血糖值(mg/dl)		血糖值(mg/dl)
空腹	≤ 95	空腹	<95
飯後 1 小時	≤ 140	飯後 1 小時	<140
飯後 2 小時	≤ 120	飯後 2 小時	<120
		糖化血色素	<6-6.5%

五、妊娠糖尿病的高危險群？

1. 高齡產婦。
2. 有糖尿病家族史。
3. 以前懷孕時曾發生妊娠性糖尿病者。
4. 懷孕中曾出現尿糖或糖尿病症狀者。
5. 空腹血糖超過 105 mg/dl 或飯後 2 小時血糖超過 120 mg/dl 者。
6. 過度肥胖者。
7. 以前懷孕曾發生不明原因的胎死腹中，尤其是在懷孕末期者。
8. 此次懷孕中發生羊水過多或胎兒過大者。

六、妊娠糖尿病對孕期的影響：

1. 對母親的影響：難產、酮酸中毒、子癲前症、羊水過多、妊娠高血壓..等。
2. 對胎兒的影響：死胎、巨嬰症、子宮生長遲滯、胎兒畸形..等。

七、妊娠糖尿病的治療：

1. **飲食控制**：妊娠糖尿病的治療以【醫療營養治療】為主。
建議照會【營養師】，由營養師制定個別化的膳食計畫，調整孕期間的營養需求、以控制體重與血糖穩定。
2. **運動**：運動可以改善葡萄糖的耐受性，維持心肺功能。建議低衝擊的體能活動，如：走路，餐後運動有助於降低餐後血糖，運動時間應不超過 1 小時，勿太疲累。
運動的禁忌：孕期有持續出血、高血壓、過早破水、早產病史等。
注意~血糖值低於 60mg/dl 或高於 200mg/dl 應避免運動。
3. **自我監測血糖**：於三餐前、睡前點心前監測血糖或餐前餐後配對測試，以了解不同時間點的血糖控制情形，作為飲食、運動或胰島素劑量的調整依據。

4. 胰島素治療：當飲食、運動無法達到穩定的血糖控制，如：空腹血糖 ≥ 95 mg/dl 或飯後 2 小時血糖 ≥ 120 mg/dl。建議使用胰島素治療，醫師根據孕婦的體重、妊娠週數、血糖及熱量攝取，來調整胰島素劑量。在產後，血糖可能回復正常，不再需要注射胰島素。

參考資料：王治元（2022）· 糖尿病衛教核心教材· 台北：中華民國糖尿病衛教學會
本院糖尿病人保健推廣中心，提供以下服務：

1. 糖尿病衛教：個別諮詢。糖尿病防治專線：05-2783865 或 05-2756000，分機 3311

2. 營養諮詢：糖尿病飲食諮詢與指導，服務專線：05-2756000 轉 1653

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2023 年 04 月校閱