



檢查時間：

民國____年____月____日 星期____上午/下午____

服用司樂舒口服液，輕腸準備：

服用方法

第一劑	____月____日 (星期____) 下午____點，將一瓶司樂舒口服液加入300c.c.較甜的無渣冷飲(如:沙士、可樂、雪碧、運動飲料等，避免深色果汁)，30分內喝完藥水後，請3-4小時內陸續分次補充水份2000c.c.以上。 1 稀釋方式 300cc無渣冷飲 45cc司樂舒 2 2000cc 分次再行補充水份 約2000cc以上
第二劑	____月____日 (星期____) 上午____點前，將一瓶司樂舒口服加入300cc較甜的無渣冷飲。喝完藥水後，請陸續分次補充水份1000 ~ 1500cc以上。
禁食禁水時間	____月____日 (星期____) 上午____點後禁食禁水
如何分辨清腸乾淨與否：	糞水呈澄清透明色才算乾淨，若沒有請繼續補充水份！ 清腸良好 excellent 清腸不乾淨 poor

注意事項：

- 1.若您正在服用其他藥物，服用清腸藥前請詢問醫師，以利評估用藥安全，並按照醫師指示服用，避免交互作用。
- 2.服用第一劑及第二劑司樂舒，前後至少相隔10小時使用。
- 3.急性胃腸潰瘍、阻塞或不明原因腹痛者，請勿任意服藥。
- 4.服藥後約30~60分鐘開始清腸作用，作用時間約4小時(依個人體質而有所不同)。
- 5.先天性巨大結腸、腸阻塞、閉鎖性肛門、充血性心臟衰竭、腎臟功能不全者請勿使用本藥品。
- 6.當排泄物呈透明黃色液體，即表示清腸完成。



聖馬爾定醫院專線：05-2756000-3313
晚上、假日：市話撥打藥物諮詢專線：0800-012-679

"永信"

司樂舒

口服液

SlipFeel

Oral Saline Laxative "Yung Shin"

永信關心您的健康

檢查/手術前飲食之注意事項：


1. 檢查前三日起請食用低渣食物(稀飯、白吐司、饅頭麵包、乾麵等)，不宜食用高纖高蛋白及肉類食物，禁止食用牛奶、豆漿。
2. 檢查前一日建議採清流質飲食。

不宜進食的飲食

檢查前三日開始不宜進食的飲食



蔬果



起司



牛奶



高纖豆漿

低渣飲食

檢查前三日三餐飲食



白稀飯



白吐司



饅頭



白飯



白乾麵



蒸蛋



去皮魚肉

無渣流質飲食

檢查前一日



清湯



濾過渣的果汁



運動飲料



白開水/蜂蜜水

※ 請務必遵守飲食建議，以達到良好的清腸效果，避免干擾檢查結果之判讀。

YUNGSHIN

永信藥品工業股份有限公司

總公司：台中市大甲區中山路一段1191號 電話：04-26875100 傳真：04-26869418

訂購專線：04-26876518、26873131 產品諮詢專線：0800-012-679

台北辦事處：台北市松山區民權東路3段181號12樓 電話：02-27187272 傳真：02-27169395

www.yungshingroup.com

若您想對以上內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000

轉 80 病房分機 8001、8002

8 樓生理檢查中心分機 3502、3503

Stm 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您

2026 年 08 月校閱