

傷口引流 的注意事項

- 1.可下床走動，下床時可用別針或夾子固定於衣服上，預防翻身或活動時拉扯到管子即可。
- 2.引流管的位置需保持低於傷口引流位置之下，以防逆流。
- 3.引流液達袋子一半時，通知護理師予以倒掉。
- 4.傷口引流處紗布滲濕時，請告訴醫護人員換藥。
- 5.勿將引流袋拖垂於地板上，造成污染。
- 6.採半坐臥及多翻身，若無特殊醫囑禁忌，儘可能及早下床活動。
- 7.勿壓迫及扭曲引流管，並觀察引流管是否通暢並固定妥善。
- 8.若使用引流瓶者，瓶子要保持站立勿傾倒。

□若有以下情形，請告訴醫護人員：

- (1)發燒，劇烈嘔吐，腹痛。
- (2)引流管滑脫。
- (3)引流出大量鮮紅色血液。
- (4)引流量突然減少或無引流量。
- (5)紗布滲液更換多次。
- (6)傷口紅腫熱痛，並有膿樣分泌物等。
- (7)引流袋，引流球快速充滿空氣時。
- (8)若引流量逐漸減少，醫師會依傷口癒合情形，拔除引流管。



若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：
05-2756000轉60病房分機6001、6002
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定
醫院 關心您

參考資料

台北榮民總院特殊護理章(傷口引流管護理)取自http://www.vghtpe.gov.tw/iframe_pat03b.html

翁淑娟、黃嫦芳、程紋貞、林麗味、趙淑美、張怡娟、陳昭吟、楊文琪、胡綾真、蔡家梅、羅靜婷 (2018) · 傷口引流管之護理 · 於李校正總校，內外科護理技術 (第八版，143-149頁) · 台北：新文京

2023年05月 第一版制