

β 交感神經阻斷劑 用藥指導

一、本院用藥藥物名稱

- 學名—Bisoprolol (商品名—Concor)康肯 5mg(淡黃色，心形)
康肯 1.25mg(白色，圓形)
- 學名—Propranolol (商品名—Propranolol 10mg)心律錠(粉紅色，圓形)
- 學名—Labetalol (商品名—Labetal 200mg/tab)(橙色，圓形)
- 學名—Atenolol (商品名—Ateol 100mg)壓平樂(橘色，圓形)
- 學名—Carvedilol (商品名—Syntrend)心全錠 6.25mg(乳白色，圓形)
心全錠 25mg(白色，圓形)
- 學名—Nebivolol (商品名—Nebilet)耐比洛錠5mg(白色，圓形)

二、藥物作用

藉由阻斷正腎上腺素的作用來控制高血壓、心律不整、狹心症及預防偏頭痛。

三、忘記吃藥時怎麼辦

想起時盡快補服，如已接近下次用藥時間，則不需補服，請勿一次服用兩倍或額外劑量。

四、藥物可能引起之副作用

1. 假如您發生下列副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即通知醫生處理：過敏反應症狀如蕁麻疹、發癢等；嚴重眩暈或失去知覺；胸部開始疼痛或胸痛更加嚴重；心跳異常；視力改變；呼吸短促；手臂或腿的水腫；勃起時間異常等。
2. 氣喘、支氣管痙攣者請告知醫師。
3. 所有藥物皆可能引起副作用。但有許多人沒有或只有輕微的副作用。假如任何一項副作用令您困擾或是不會消退，請回診告知醫師。以下並未涵蓋所有可能發生的副作用，若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師：眩暈、腹瀉或稀便、感覺疲倦或虛弱、噁心或嘔吐、睡眠障礙。

五、服藥注意事項

1. 若服藥後造成頭暈、嗜睡，請避免開車及從事機械活動。
2. 需定期量血壓及回診檢查，適度運動及飲食控制才能確保血壓控制得宜。
3. 每天定時量脈搏速率，若脈搏比平常減少很多時或是每分鐘小於 50 次以下，請告訴主治醫師。
4. 未經醫師指示不可擅自停藥，若突然停藥，可能會引起胸痛或心臟病發作。

六、儲存方式

本藥應儲存於緊閉容器，儲存於室溫下，遠離濕氣及陽光照射之處，並置於兒童拿不到的地方。

參考資料

Concor 5 毫克藥品說明書 2020 年 8 月

Concor 1.25 毫克藥品說明書 2020 年 8 月

Propranolol 藥品說明書 2021 年 10 月 01 日

Labtal 藥品說明書 2020 年 7 月 27 日


Ateol 藥品說明書 2018 年 7 月 01 日

Syntrend 6.25 毫克藥品說明書 2022 年 08 月 05 日

Syntrend 25 毫克藥品說明書 2022 年 08 月 05 日

Nebilet 藥品說明書 2015 年 1 月

若您想對以上的內容進一步了解，請洽藥物諮詢專線：05-2756000 轉 3102

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2023 年 04 月校閱