

# 腦室腹腔引流手術

## 一、何謂腦室腹腔引流術：

利用單向瓣膜之引流管，將管子一端放入腦室，經皮下通到腹腔內，當腦室內壓力升高至某一壓力時，可將腦脊髓液引流至腹腔。

二、腦室腹腔引流術適應症：常壓性水腦症、阻塞性水腦症及腦室出血等。

## 三、腦室腹腔引流手術目的：

當腦脊髓液產生過多或通路受阻時，導致腦內脊髓液存留過多，造成水腦，故利用分流手術，將腦脊髓液引流到腹腔，以減輕腦部內的壓力。

## 四、手術後照護指導：

1. 護理人員會密切監測血壓、脈搏、呼吸、意識狀況、肢體活動力量及瞳孔大小與對光反應。
2. 因為行全身麻醉，手術後仍需禁食，再由醫師決定進食時間。
3. 當您手術傷口疼痛時，護理人員依照醫囑給予注射止痛劑以減輕疼痛。
4. 建議給予患者安靜舒適的環境，避免刺激病人，增加腦壓。
5. 提醒您合宜的臥姿及翻身：
  - (1) 將床頭抬高 30 度，避免採頭低腳高或俯臥姿勢。
  - (2) 為免壓力改變太快，應慢慢抬高床頭。
  - (3) 準備下床時，需慢慢改變姿勢，床頭搖高再坐起，在沒有頭暈情形時才下床，以免造成姿位性低血壓
  - (4) 勿將頭頸部過度屈曲，盡量保持頭頸一直線。
  - (5) 避免顱內壓升高動作如：用力解便、咳嗽。
6. 通常術後如果沒有噁心、嘔吐的情形即可開始進食。
7. 臥床時，躺向健側，勿壓迫傷口，以免傷口壓痛以及產生壓瘡
8. 請勿強制約束病人，以免因掙扎導致腦壓升高，可拉上床欄，以保護病人安全。
9. 護理人員會隨時檢視引流管位置及傷口是否滲血情形。

## 五、居家照護及注意事項：

1. 提醒您觀察頭部傷口是否有發炎反應（紅、腫、熱、痛），洗澡後請保持傷口乾燥，避免頭部傷口直接壓迫。

2. 若您有下列情形時請速回急診就醫：

- (1) 意識慢慢改變如嗜睡、混亂、不清醒。
- (2) 頭痛加劇、嘔吐。
- (3) 呼吸困難。
- (4) 手腳或嘴角抽筋。


3. 請依醫囑指示服藥，定期回診追蹤。

#### 參考資料

劉雪娥總校訂(2020)·成人內外科護理下冊(八版)·台北：華杏

于大雄、陳錫根·手術室常見技術及照護手冊(第二版)·台北：合記

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉 70 病房分機 7001、7002

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您  
2023年03月校閱