

# 腸套疊

## 一、前言：

腸套疊在小孩的腹部急症中很常見，造成的原因不明，可能是因為病毒感染造成小腸蠕動異常，而使小腸套入大腸。常見於3個月~3歲的兒童，80%的病例發生於1歲以內。腸套疊80%都發生在迴結腸的位置。

## 二、常見的症狀：

腸套疊主要有三大症狀，分別為腹痛，嘔吐及解血便。其典型症狀為突然出現腹部絞痛、無法安撫的哭泣，且會將膝蓋縮到胸前。小朋友會一陣一陣哭鬧，每隔十至二十分鐘就會痛一次，但不痛時可以正常活動。此外初期嘔吐多為吐奶或食物(不含膽汁顏色)，但隨時間若腸子未解套，就會漸漸出現黃綠色膽汁的嘔吐物。另外在幾個小時後，約60%病例會解出草莓果醬顏色的大便，之後病人也會漸漸顯得倦怠。

## 三、治療方式：


※內科治療：最主要是靠壓力的灌腸。若病人在48小時內，臨床上還未出現腹膜炎症狀，可以考慮鉬劑或食鹽水灌腸，並將腸套疊推回去，其它則有水分補充等。

※外科治療：若病人出現腹膜炎症狀則要考慮進行手術切除壞死的腸子。

## 參考資料

穆佩芬總校訂(2019)·兒科護理學(6版)·台北：新文京。

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉 40 病房分機 4001、4002

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您

2022年07月校閱