

# 抗血小板凝集劑 Aspirin 用藥指導

## 一、藥物外觀



## (一)作用

減少血小板凝集預防心肌梗塞



## (二)副作用


- 1.嚴重腹痛、瘀血或嘔吐物有咖啡色塊狀物、便血或尿血、蕁麻疹、皮膚起紅疹、搔癢、呼吸困難、耳鳴、嚴重的頭昏與倦怠。
- 2.罕見但嚴重之皮膚不良/過敏反應：喉痛、口腔黏膜潰爛、皮疹等症狀。



紅疹癢



頭暈/倦怠



出血/腫脹



呼吸困難



口腔潰爛



腹痛/嘔吐

## 二、保存方式

保持藥物在原包裝或緊閉容器中，儲存於室溫下，遠離濕氣及陽光照射之處。



放置於兒童拿不到的地方。

## 三、溫馨提醒

### 1. 有以下狀況請告知醫師

- 對Aspirin或其他藥物有過敏的反應。
- 氣喘、消化性潰瘍、糜爛性胃炎、肝臟、腎臟疾病、出血性疾患或血友病。
- 接受任何手術或拔牙時。

2. 不可與牛奶或制酸劑一起服用，以免降低藥效，若需併用，應間隔1小時。

3. 不可與酒精飲料一起服用，可能造成胃出血。

### 4. 忘記吃藥時怎麼辦呢？

想起時盡快**補服**，如已接近下次用藥時間，則**不需補服**，請勿一次服用兩倍或額外劑量。

## 四、參考資料

藥品說明書 2019 年 9 月

若您想對以上的內容進一步了解，

請洽諮詢電話：05-2756000 轉 心臟科加護病房分機 3621、3622

藥物諮詢專線：05-2756000 轉 3102

Stm 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您  
2022年05月修訂