

猩紅熱

什麼是猩紅熱？

原因

- A族β型溶血性鏈球菌造成
- 於咽喉部位感染
- 常見於5~15歲兒童

症狀

- 突然高燒、嘔吐、頭痛
- 咽喉發炎、舌頭腫脹發紅
- 扁桃腺充血腫脹，可能覆蓋有灰白色滲出物

早期與後期變化

- 舌頭
- 早期：舌面的乳突上覆有一層白色膜，稱為【白草莓舌】
- 後期：白膜脫落，舌面上出現紅色乳突，稱為【紅草莓舌】

- 皮膚
- 早期：皮膚出現紅斑及針點狀皮疹，受壓時變白，質地如粗糙砂紙般
- 後期：會由臉部開始至軀幹和四肢出現脫皮，約持續一週

【白草莓舌】



【紅草莓舌】



皮膚紅斑及針點狀皮疹



皮膚脫皮



如何治療？

- 目標在於減輕症狀、預防合併症
- 青黴素類**抗生素治療**，需**連續使用10天**

合併症

- 鼻竇炎、中耳炎、乳突炎
- 頸部淋巴腺炎、支氣管肺炎
- 腦炎
- 非化膿性者，主要是急性腎絲球腎炎及急性風濕熱

參考文獻

陳月枝總校閱(2023) · 實用兒科護理 · 台北：華杏。

2025年9月 第一版制

 天主教聖馬爾定醫院
ST. MARTIN DE PORRES HOSPITAL

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉 40 病房 4001、4002
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您