困難梭狀桿菌照顧者注意事項

列印日期: 年 月 日

單位:

05-2756000 分機:

一、何謂困難梭狀桿菌(Clostridium difficile)?

困難梭狀芽孢桿菌(Clostridium difficile)是一種革蘭氏染色陽性且會形成孢子的厭氧性桿菌。此菌在臨床上主要是造成胃腸道的感染,涵蓋範圍可從無症狀的移生或輕微無併發症的腹瀉,到嚴重的腹瀉、偽膜性大腸炎(pseudomembranous colitis)、毒性巨結腸症(toxic megacolon)等,並可能造成病人的敗血症,甚至死亡。

二、感染方式:

此細菌主要分佈於病人之體液、分泌物、皮膚、病床環境,尤其是受到帶有此菌之糞便所污染的醫療設備表面或環境,以及帶菌病人的浴室內常被接觸的地方,或透過照顧者或接觸者的雙手直接或間接來傳播。

三、照顧者應注意事項:

- 1. 為了維護您與訪客的健康,應要求訪客儘量減少來院探病。
- 2. 照顧者若換人時,請交代清楚-照顧者應注意事項-之內容。
- 3. 接觸病人前後,請記得務必用肥皂或消毒性洗手液來洗手。
- 4. 照護病人時,

例如:傷口換藥、換尿片或抽痰時, 請您一律穿著隔離衣、戴手套、

配戴口罩,且結束後應立即脫除及洗手,以避免接觸病人的體液、

分泌物等之病原體散佈環境中。



5. 隔離衣每次使用後更換,

脱除時由內往外包好,

放至黄色污衣筒內。

接觸病人前、後及摸到病人周圍環境

(例如:床、床旁桌、椅子等)

後需更換手套並使用肥皂或消毒性洗手液洗手。



- 6. 非入住單人房之病人,避免使用公共馬桶,請用便盆椅,並於使用完畢後置入一顆漂白錠加蓋靜置 10 分鐘後,倒入馬桶並沖洗乾淨,便盆椅則請照顧者或護理站負責人員協助後續消毒處理後才可歸回。
- 7. 尿布使用者,請丟棄於紅色感染性感染性垃圾筒中。
- 6. 病人使用過的床單、被套請捲好放於黃色污衣筒內。
- 7. 洗手後,應用水將水龍頭的把手一併沖洗,以避免洗乾淨的手再次被污染。
- 8. 為了減少感染,請照顧者(家屬)自備衣物,並帶回家清洗。
- 9. 欲離開病人單位時,請務必將隔離衣物脫除並確實洗手後再行離開。

參考資料

賴玉琪 ; *困難梭狀桿菌引起之感染及治療* 嘉基藥訊 131 期 (2017/09),4-7 洪元斌、柯文謙 等(2017,2 月)·*困難梭狀桿菌感染之感染控制措施*·感染控制雜誌 27(1)。