## 全克痛貼片簡介及使用須知

- 一、全克痛(Transtec)貼片介紹:
- 1. 它是一種經皮下吸收止痛劑之貼片,專門給予癌症末期病人疼痛治療之用。



2. 可用於需長期全天性使用類鴉片鎮痛劑之中度至重度癌症疼痛,以及對非類鴉片鎮痛劑無效之重度疼痛。(但僅限用於曾經使用過類鴉片藥物的患者)

## 二、使用步驟:

	11 夕 · ** · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第一步	撕開包裝,取出貼片後 <b>撕去背膜</b>	The second secon
第二步	1. 貼片部位選擇以無毛髮處為佳,如:胸前、後背,且應避開傷口和放射治療部位。	3/2 ~ 4/1 (2 = 00
	2. 欲黏貼片部位用清水擦拭即可〈禁用肥皂、洗劑等清潔用品〉,待皮膚 完全乾燥後貼上,用手掌按30秒, 確保四個角落都貼好。	

第三步	在記錄表上記錄使用日期和時間(貼片上也可直接書寫日期)。	次數 1 2	貼日	上 則 / [	贴片間	操簽	作	人舅	<b>                                      </b>	r 下 期 /	貼片間	操簽	作。	人員章	回收紀錄及說明
第四步	每張貼片之 <b>有效期限為 3-4 天</b> ,依醫師 指示,在第 3 或第 4 天到期時,於其 他部位貼上新的貼片後,將舊貼片撕 下並在記錄表記錄撕下日期。														
第五步	舊的貼片放回盒子或包裝紙,並請暫時保留,下次回診時連同使用記錄表交回給醫院。				FIRST STATES		Em Show	Bonna 35	片刻	1					

## 三、注意事項:

- 1. 使用時較常貼於胸前皮膚上,因為該處表皮較薄血管豐富,較易吸收。
- 2. 貼片剛貼上時並不會立即產生止痛效果,所以在第一次使用貼片開始 12 小時內,應 有其他非貼片類藥物輔助使用。
- 3. 小部份病人對貼片較敏感,會有噁心、嘔吐及嗜睡,或皮膚輕微紅疹或癢的現象,請 不要擔心,如果有呼吸困難或呼吸次數減少現象,請馬上告知您的醫護人員。
- 4. 您可以洗澡、游泳,但不要泡太熱的水以及用水柱強力沖洗以免脫落,若不小心脫落, 可重新貼一片。

## 參考資料

衛生福利部食品藥物管理署。癌症疼痛照護及成癮性麻醉,藥品使用參考手冊。 衛生福利部。2021年。http://www.fda.gov.tw/TC/publicationsContent.aspx?id=145

癌症疼痛照護衛教手冊(民眾版),112年12月 第一版

若您想對以上的內容進一步了解,藥物諮詢專線:05-2756000轉 3110、1970

**州** 所天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您

2024年09月校閲