

降血脂劑 用藥指導

一、本院用藥藥物名稱

- 學名—Atorvastatin 10mg (商品名—Tulip, 妥寧膜衣錠)(白色圓型)
- 學名—Fluvastatin 80mg/Tab (Lescol XL, 益脂可)(土黃色, 圓形)
- 學名—Simvastatin 20mg/Ezetimibe 10mg(商品名—Vytorin, 維妥力)(白色橢圓形)
- 學名—Pravastatin 40mg (商品名—Mechol, 勝脂錠)(淡黃色, 圓形)
- 學名—Pitavastatin 2mg (商品名—Livalo, 力清之)(粉紅色, 圓形)
—Pitavastatin 4mg (商品名—Zulitor, 平脂膜衣錠)(白色, 圓形)
- 學名—Rosuvastatin 10mg (商品名—Crestor, 冠脂妥)(淡紅色, 圓形)
- 複方藥品：Amlodipine 5mg/Atorvastatin 10mg (商品名—Caduet, 脂脈優)(白色橢圓形)
- 複方藥品：Amlodipine 5mg/Atorvastatin 10mg (商品名—Dualpress, 克壓脂)(白色橢圓形)

二、藥物作用

用來降低血中過高的膽固醇，以減少心血管疾病及預防中風的發作。

三、正確服用方法

請配合醫師指示用藥，於每日相同時間服用此藥，即使狀況良好，仍應按指示服用。

四、忘記吃藥時怎麼辦

想起時盡快補服，如已接近下次用藥時間，則不需補服，請勿一次服用兩倍或額外劑量。

五、藥物可能引起之副作用

1. 即便極為罕見，有些人服用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。假如您發生下列副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即通知醫生處理：過敏反應症狀如蕁麻疹、發癢等；胰臟炎的症狀如嚴重胃痛、嚴重背痛或嚴重胃部不適或嘔吐；尿中帶血；無法排尿；肝臟問題如：尿色深、感到疲倦、沒有飢餓感、胃部不適或胃部疼痛、糞便顏色不深、嘔吐或者皮膚或眼睛泛黃；異常肌肉疼痛、觸痛或虛弱無力。
2. 所有藥物皆可能引起副作用。但有許多人沒有或只有輕微的副作用。假如任何一項副作用令您困擾或是不會消退，請回診告知醫師。以下並未涵蓋所有可能發生的副作用：頭痛、腹痛、噁心、關節痛、虛弱，若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

六、服藥注意事項

1. 曾對本藥或類似藥物過敏，請先告知醫師。
2. 因此藥會傷害胎兒，故在服藥期間需確實避孕。
3. 服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。
4. 所有患者在治療前皆建議作肝功能檢查，之後並定期複檢。若有肝功能指數升高超過正常值3倍，則需停止治療。
5. 大量飲酒或曾經罹患肝病的患者應小心使用。
6. 益脂可不可磨粉或嚼碎。
7. 使用此藥品要同時配合飲食控制、運動，還要避免高膽固醇的食物。
8. 盡量避免和葡萄柚汁一起服用，以免增加副作用發生。
9. 哺乳婦女禁止使用本類藥品。

七、儲存方式

1. 請儲存於緊密容器中，置於室溫乾燥處。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料

Tulip 藥品說明書 2022 年 11 月 22 日

LescolXL 藥品說明書 2022 年 11 月 08 日

Vytorin 藥品說明書 2023 年 02 月 15 日

Mechol 藥品說明書 2022 年 10 月 11 日

Crestor 藥品說明書 2023 年 03 月 02 日

Livalo 藥品說明書 2023 年 02 月 18 日

Caduet 藥品說明書 2023 年 02 月 16 日

Zulitor 藥品說明書 2022 年 11 月 25 日

Dualpress 藥品說明書 2023 年 03 月 28 日

<https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/> (cited: 04/19/2023).

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉

心臟科加護病房分機 3621、3622

藥物諮詢專線：05-2756000 轉 3102