

血管收縮素轉化酵素抑制劑 用藥指導

一、本院藥物名稱

- 學名—Perindopril (商品名—Acertil 5mg) 雅施達錠
- 學名—Captopril (商品名—Cabudan 25mg) 卡布登錠
- 學名—Amlodipine 5mg + Benazepril 10mg (商品名—Amtrel Tab) 諾壓錠

二、藥物作用

使血管擴張、減少體內鈉及水分的滯留，可用來治療高血壓及心衰竭，和利尿劑併用效果更加顯著。

三、正確服藥方法

飯前1小時或飯後2小時服用，空腹吃效果最佳。

四、忘記吃藥時怎麼辦

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

五、藥物可能引起之副作用

常見副作用為乾咳、鉀離子過高、發癢、臉部或手的腫脹、嘴巴或喉嚨的腫脹或刺痛感、噁心或嘔吐。味覺障礙(通常2-3個月內可自然恢復)

六、服藥注意事項

1. 頭暈嗜睡時避免開車及從事機械活動。
2. 注意!! 想要懷孕者及孕婦禁用，有導致畸胎的風險！
3. 需定期量血壓及回診檢查，適度運動及飲食控制才能確保血壓控制得宜。
4. 進行手術前(包括拔牙)，或緊急醫療情況下，請事先告知醫師，您正在服用此藥。

七、儲存方式


保存藥物於原包裝及緊閉容器中，儲存於室溫下，遠離潮濕及陽光照射之處，並放置於孩童拿不到之處。

參考資料

Acertil 藥品說明書 2022 年 07 月 21 日

<https://www.micromedxsolutions.com/micromedex2/librarian/> (cited: 05/09/2023).

若您想對以上的內容進一步了解，請洽藥物諮詢專線：05-2756000 轉 3102

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2023 年 05 月校閱