

## 週邊血管擴張劑 用藥指導

### 一、本院藥物名稱

□學名—Hydralazine(商品名—Apresoline、Aprezine)阿普利素寧 50mg、壓平利淨錠 10mg

□學名—Minoxidil(商品名—Loniten 10mg)洛寧錠

### 二、藥物作用

直接鬆弛血管平滑肌，主要是小動脈，因而降低末梢血管阻力，用於治療高血壓。

### 三、忘記吃藥時怎麼辦：

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

### 四、藥物可能引起之副作用：

周邊神經炎、心搏過速、頭暈、頭痛、食慾減退、臉潮紅、多毛症、全身性紅斑性狼瘡樣症狀等。

### 五、服藥注意事項

1. 此類藥可能會造成暈眩或昏昏欲睡的副作用，如有症狀請避免開車或操作機器。
2. 請遵照醫師指示服藥，切勿擅自停藥或更改藥量，需定期量血壓及回診檢查，適度運動及飲食控制才能確保血壓控制得宜。
3. Loniten 禁用於嗜鉻細胞瘤（pheochromcytoma）病人。

### 六、有以下情況務必告知醫師

對此類藥物過敏者、正在懷孕及哺乳者、有氣喘、腎臟病、紅斑性狼瘡或中風病史者、體重快速增加、四肢有水腫情況者。


### 七、儲存方式

保存藥物於原包裝及緊閉容器中，儲存於室溫下，遠離潮濕及陽光照射之處，並放置於孩童拿不到之處。

### 參考資料

<https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/> (cited: 04/26/2023).

若您想對以上的內容進一步了解，請洽藥物諮詢專線：05-2756000 轉 3102

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您  
2023年04月修訂