

認識猴痘病毒



猴痘是由猴痘病毒引起的疾病，屬於人畜共通傳染病，與天花屬於同一病毒家族，症狀相似但嚴重度較輕，而且猴痘很少致命。病毒會透過染疫的野生動物(如：狐猴、猿猴、老鼠、松鼠等靈長類或嚙齒類動物等)傳染給人。



猴痘病毒可分為中非(剛果盆地)分支病毒和西非分支病毒，111年發生的猴痘疫情主要為西非分支病毒，致死率約為3-6%，雖然西非分支病毒較天花(1-10%)少致命一些，但仍可能於免疫不全、小孩等病人造成死亡，且皮疹症狀造成疼痛與不適。

2

猴痘病毒傳播方式與潛伏期



✓ **人畜共通傳染**：直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類。



✓ **人傳人**：接觸到感染者呼吸道分泌物、皮膚或黏膜或被汙染物品，及任何形式性行為等密切接觸而感染。111年猴痘疫情大多為因性行為接觸(但不限)而傳染。飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生，因此醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。

✓ **潛伏期約介於5至21天。**



3

感染猴痘病毒的症狀



- ✓ 猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。
- ✓ 常見症狀為發燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴腺腫大等症狀，發燒1-3天後會出現不同型態的皮膚病灶(如:皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等)，部分亦出現在生殖器上。
- ✓ 與水痘最大的差別是有**淋巴結腫大**的症狀，而且在兒童或免疫低下者尤其容易導致重症。

圖片參考來源：美國CDC、歐盟CDC及新英格蘭NEJM期刊等相關文獻

病灶參考圖片



症狀不典型，如有出現疑似症狀，都應該立即就醫，交由專業醫師評估嘍！

4

猴痘的預防方式



降低人畜共通傳播風險

- 前往猴痘病毒流行地區時：
- ✓ 避免接觸齧齒動物和靈長類動物以及生病或死亡動物。
 - ✓ 所有食物必須**徹底煮熟**後才能食用。
 - ✓ 保持良好**手部衛生**

曾至流行地區，入境時如出現疑似症狀，請戴好口罩並主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊或接觸史。回國後，若有疑似疑似症狀，亦應儘速就醫。

隨時提高警覺心，以降低感染風險！

降低人際間傳播風險

- ✓ 避免與猴痘感染者接觸，與人密切接觸之場域**配戴口罩可預防感染**。
- ✓ 勿與陌生人發生性行為或多重性伴侶、不參加性派對，發生性行為時務必**全程戴保險套(同時預防性病)**。
- ✓ 保持良好**手部衛生**

其它詳細資訊請到疾管署全球資訊網「猴痘專區」查閱



5

引用資料來源：衛生福利部疾病管制署

<https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/2Jb46Kh9TTN6-ul8gjDB8g>

Stm天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您