



天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院

檢驗科_特定檢驗項目檢體採檢說明(二)

糞便細菌、病毒檢驗

- 沙門氏/志賀氏桿菌 (Stool salmonella/shigella culture) 培養：

使用紅頭的傳送管收集。

取出乾淨無菌棉棒，直接沾取新鮮剛解的糞便，盡可能收集有黏液、有膿、有血的糞便，並且整個棉花部分須完全沾到糞便，或挖一個米粒大小之糞便亦可。打開另一管含有培養基的傳送管，將取得糞便的棉棒插到底蓋緊（如下圖），於 24 小時內連同本單送至檢驗科。

★請將白色蓋子打開；



★將沾好的棉棒整支插入傳送管內蓋緊。



注意：★紅頭傳送管，不用冰。

- 諾羅病快速檢驗：

請旋開採檢盒，使用盒蓋小挖匙挖取約一個豌豆大小之糞便，盡可能收集有黏液、有膿、有血的糞便，若為水便則取 1~2 cc，將取得糞便的盒蓋放回採檢盒中並蓋緊盒蓋。於 24 小時內連同本單送至檢驗科，室溫保存。

- H. pylori 幽門螺桿菌抗原檢驗：

採檢前注意事項：請勿將管內液體倒出或是任意於管中加水，當天若為水便或硬便請擇日採檢。

採檢步驟：轉開採檢管蓋子（下蓋），將採檢棒取出，隨機在至少 3 個不同位置將採檢棒插入糞便（約 1/4 顆豌豆大小），確認螺旋端有糞便後將採檢棒插回採檢管中，並旋緊下蓋後連同本單立即送檢，若無法於 6 小時內送達檢驗科，請先暫放冰箱冷藏（2-8°C），最好在 24 小時內送檢，不得超過 3 天，以免影響檢驗結果。



- 輪狀病毒 (Rotavirus) 檢驗 (Rota Virus Antigen)：

使用無菌乾淨棉棒。

取出乾淨無菌棉棒，直接沾取新鮮剛解的糞便，盡可能收集有黏液、有膿、有血的糞便，並且整個棉花部分須完全沾到糞便，或挖一個豌豆大小之糞便亦可，若為水便則取 1~2 cc。將取得糞便的棉棒放到空白玻璃試管中，於 24 小時內連同本單送至檢驗科，室溫保存。

採檢說明者簽名：_____

- 採集時間____點____分。

- 請您於____月____日前將檢體送至檢驗科，逾期無效，請您請醫師重開檢驗醫令。

- 交付檢體步驟：攜帶健保卡至檢驗科報到機→插入健保卡→選取 2「只送檢體不抽血」，等待叫號。

抽血處服務時間：

星期一~五：早上 07:00~晚上 10:00。星期六：早上 07:00~下午 06:00。例假日不受理！

表單編號：H3L0-W-R01-05

檢驗科製