

抗血小板凝集劑Clopidogrel (hydrogen sulphate)用藥指導

藥物外觀



作用

抑制血小板凝集，促進血液循環，
預防中風、心臟病發作

副作用

- 1.中樞神經：頭痛、眩暈。
- 2.心血管：血腫。
- 3.胃腸：腹痛、消化不良、下痢、噁心、腸胃道出血。
- 4.血液：紫斑病、血小板缺乏症。
- 5.呼吸：鼻出血。
- 6.皮膚：發疹、搔癢、瘀血。



儲存方式

保持藥物在原包裝或緊閉容器中，儲存於室溫下，遠離濕氣及陽光照射之處，並置於兒童拿不到的地方。



注意事項

- 1.服用此藥若發生：(1)過敏症狀(2)出血症狀(3)肝臟問題症狀，請儘速與醫師聯絡回診檢查。
- 2.應先告知醫師：有凝血功能異常問題，欲進行手術，懷孕、哺乳者，嚴重肝功能不良。
- 3.若服用下列藥物：warfarin 脈化寧錠(抗凝血劑)、非類固醇抗發炎止痛劑(NSAIDs)、阿斯匹靈(aspirin)、耐適恩(esomeprazole)或悠胃樂(omeprazole)等請告知醫師。
- 4.請勿自行將藥物拿給別人吃，以免發生意外。
- 5.嚴禁擅自停藥。

參考資料

Plavix 仿單 2020 年 3 月

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉

心臟科加護病房分機 3621、3622

藥物諮詢專線：05-2756000 轉 3102

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您

2023 年 09 月修訂