

新生兒中重度病房出院須知

親愛的爸爸、媽媽：

恭喜您們！可愛的寶寶就要回家了！我們在此提供返家後的注意事項。

一、新生兒營養：希望您出院後仍能持續哺餵母乳！

若特殊狀況無法哺育母乳時，可使用嬰兒配方奶粉代替。

- 目前寶寶進食奶量每____小時，____CC。
 - 奶粉沖泡方式：請依照奶粉品牌_____指示沖泡，1平匙____ml。
 - 沖泡奶粉需使用煮沸過的水(水溫攝氏70度以上，世界衛生組織建議)。
 - 請於餵食前20-30分鐘沖泡，待配方奶降溫後再餵食；
如急需餵食，請用冷水沖涼後再餵食，避免燙傷寶寶。

二、預防注射

請依照兒童健康手冊疫苗接種表時間，攜帶兒童健康手冊及健保IC卡，至本院掛號小兒科門診注射疫苗。

三、新生兒篩檢

您的寶寶新生兒篩檢於____年____月____日已做。

- 報告有異常，約1-2週會接獲本院預防注射室電話通知複檢。
- 未接獲通知，可於2-4週掃描寶寶手冊第一頁上的QR-Code查詢結果。
- 因尚未知道篩檢結果寶寶是否有G-6-PD缺乏症(俗稱蠶豆症)前，請不要讓寶寶接觸到芥丸(俗稱臭丸)，也不可任意服用藥物。
- 蠶豆症複檢：嘉義地區均由嘉義基督教醫院電話通知複檢。

以上有疑問皆可電洽本院預防注射室，電話：05-2756000轉3312。

您的寶寶為小於37週早產兒，須做新生兒篩檢複檢，

請依回診單於____年____月____日，至本院4樓小兒科門診看診，進行複檢。

四、門診追蹤

無 有，詳見回診預約單。

五、臍帶護理

臍帶脫落視個別情況約1-2週脫落。請依照護理指導以75%酒精與95%酒精進行照護。臍帶快脫落時及剛脫落後，有少許滲血是正常現象，持續臍帶護理至完全乾淨為止。

若臍帶有臭味或周圍皮膚紅腫，可能是臍帶炎應盡快就醫。

Stm天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院

六、若有以下情形，請就醫看診。臍部分泌物多且有異味、皮膚變黃(請在白色日光燈下觀察膚色變化)、體溫超過 38°C 或低於 36°C (經處理仍無改善)、腹瀉、腹脹、嘔吐、食慾突然欠佳、大便顏色異常。

參考資料

衛生福利部國民健康署(2024)・兒童健康手冊(第 19 版)・臺北市：衛生福利部國民健康署(2024)・取自

<https://www.hpa.gov.tw/Pages/EBook.aspx?nodeid=1139>

如果對以上的內容有任何問題，洽諮詢電話：(05) 2756000 轉 4507、4508。

Stm天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您

2024 年 09 月修訂