

保鉀利尿劑 用藥指導

一、本院藥物名稱

□學名—Spironolactone (商品名—Spironolactone 25 mg)歐得通錠

□學名—Amiloride 5mg + Hydrochlorothiazide 50mg (商品名—Amizide)安立壓錠錠

□學名—Eplerenone (商品名—Inspra 50mg/tab)迎甦心膜衣錠

二、藥物作用

幫助身體排除多餘的水份，用來改善高血壓、心衰竭、嚴重肝病引起的腹水或腎臟疾病引起的水份滯留。

三、正確服藥方法

每天早餐後服用效果最好；晚上服用可能會造成夜間頻尿，請盡量在晚上6點前服藥以免影響睡眠品質。

迎甦心膜衣錠隨餐或空腹服用均可。

四、忘記吃藥怎麼辦

想起時儘快補吃一次劑量，若已經接近下次吃藥時間則不需補服藥品，避免同時使用兩次劑量而造成藥物過量。

五、藥物可能引起之副作用

1. 保鉀利尿劑可能產生鉀離子偏高，症狀包括感覺異常、心跳不規律、呼吸急促、手腳或嘴唇麻木感、噁心嘔吐、無力等，如有上述現象請告知醫師。
2. Spironolactone可能造成**男性乳房增大**、性功能降低，女性月經失調，若副作用發生時請告知醫師，這些問題在停藥後會逐漸消失，不用太擔心。

六、服藥注意事項

1. 藥物可能會使您感到想睡，開車或操作機器請小心；若您到其他醫師就診時，請主動告知他們您正在服用此藥物。
2. 即使沒有高血壓症狀，也不能擅自停藥，仍然應該按時服藥、定期測量血壓及回診檢查，同時遵照醫師指示做運動及飲食控制，才能確保血壓控制得宜。

七、儲存方式

保持藥物在原包裝或緊閉容器中，儲存於室溫下，遠離濕氣及陽光照射之處，並放置於兒童拿不到的地方。


參考資料

Amizide 藥品說明書 2019 年 12 月 09 日

Inspra 50mg/tab 藥品說明書 2018 年 05 月

<https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/> (cited: 05/12/2023).

若您想對以上的內容進一步了解，請洽藥物諮詢專線：05-2756000 轉 3102

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2023 年 05 月校閱