

兒童近視防治點用 Atropine 注意事項


Atropine(阿托品)長效型散瞳劑眼藥水是最有效減緩近視的方法。

使用前，應先與家長溝通長效型散瞳劑眼藥水帶來的不便及可能影響。例如：

1. 因睫狀肌麻痺所引起的調視機能下降，或可配戴多焦眼鏡來減少閱讀寫字的不便。
2. 由於瞳孔散大，會有較多的光線(含紫外線)進入眼睛，長期使用是否會對水晶體或網膜產生不良影響，目前仍屬未知，建議戶外活動可戴帽或合格太陽眼鏡為宜。
3. 長期使用散瞳劑眼藥水，停藥之後，仍可能暫時有視力調節能力降低現象。
4. 幼童視覺機能尚未發育完全前，必須謹慎使用長效型散瞳劑眼藥水。
5. Atropine 眼藥水引起過敏反應非常罕見，初次使用須留心注意。
6. 極少數早產兒使用 Atropine 可能引起眼壓升高，亦須小心使用。

使用 Atropine 眼藥水必定出現【**近距離的視力下降**】、【**戶外畏光現象**】，但與增加的近視度數造成的眼睛傷害相比仍是**優點大於缺點**的最有效方法。

治療上如有不適狀況時，請至眼科門診就醫(上午 09:00-11:00、下午 13:30-16:00)。

天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2023 年 07 月修訂

兒童近視防治點用 Atropine 注意事項


Atropine(阿托品)長效型散瞳劑眼藥水是最有效減緩近視的方法。

使用前，應先與家長溝通長效型散瞳劑眼藥水帶來的不便及可能影響。例如：

1. 因睫狀肌麻痺所引起的調視機能下降，或可配戴多焦眼鏡來減少閱讀寫字的不便。
2. 由於瞳孔散大，會有較多的光線(含紫外線)進入眼睛，長期使用是否會對水晶體或網膜產生不良影響，目前仍屬未知，建議戶外活動可戴帽或合格太陽眼鏡為宜。
3. 長期使用散瞳劑眼藥水，停藥之後，仍可能暫時有視力調節能力降低現象。
4. 幼童視覺機能尚未發育完全前，必須謹慎使用長效型散瞳劑眼藥水。
5. Atropine 眼藥水引起過敏反應非常罕見，初次使用須留心注意。
6. 極少數早產兒使用 Atropine 可能引起眼壓升高，亦須小心使用。

使用 Atropine 眼藥水必定出現【**近距離的視力下降**】、【**戶外畏光現象**】，但與增加的近視度數造成的眼睛傷害相比仍是**優點大於缺點**的最有效方法。

治療上如有不適狀況時，請至眼科門診就醫(上午 09:00-11:00、下午 13:30-16:00)。

天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2023 年 07 月修訂