

抗癌危害性藥品居家防護注意事項

Q1： 結束化學治療後，返家 48 小時內我要注意什麼？

A1

1. 建議男病人坐著上廁所，減少尿液噴濺。
2. 上完廁所(大小便)，蓋上馬桶蓋沖水二次，用肥皂和水洗手。
3. 腸造口病人使用拋棄式造口袋。
4. 避免發生性行為或是於性行為時配戴保險套。

Q2： 排泄物要怎麼辦？

A2

1. 處理排泄物（尿液、糞便、唾液、嘔吐物、陰道分泌物、精液等），應戴**雙層手套**。
2. 衣服碰到排泄物，與一般家用衣物分開**清洗二次**，或將染污被服裝入拋棄式塑膠袋密封，依一般垃圾丟棄處理。

Q3：

我的口服化療居家藥品要怎麼保存放置？



A3： 1. 放置於原始容器中，不要使用自備藥盒，依藥袋上標示溫度儲存。

參考資料

張黎露、江孟冠、姜紹青、邱詩怡（2020）。抗癌危害性藥品居家防護指引。腫瘤護理雜誌（20增訂刊），81-90。

若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉 95 病房分機 1951、1952

Stm 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2023年03月校閱