

血管收縮素II拮抗劑 用藥指導

一、本院藥物名稱

- 學名—Irbesartan (商品名—Aprovel 300mg)安普諾維膜衣錠
- 學名—Irbesartan (商品名—Irbetan 300mg)爾壓順膜衣錠
- 學名—Telmisartan (商品名—Micardis 40mg)必康平錠
- 學名—Valsartan (商品名—Diovan 80mg)得安穩膜衣錠
- 學名—Azilsartan(商品名—Edarbi 40mg)易得平錠
- 學名—Valsartan 80mg + HCTZ 12.5mg (商品名—Co-diovan)可得安穩膜衣錠
- 學名—Valsartan 80mg + Amlodipine 5mg (商品名—Exforge)易安穩膜衣錠
- 學名—Valsartan 160mg + Amlodipine 5mg + HCTZ 12.5mg(商品名—Exforge HCT)
力安穩膜衣錠
- 學名—Telmisartan 80mg + Amlodipine 5mg(商品名—Twynsta)倍必康平錠
- 學名—Olmesartan 40mg + Amlodipine 5mg(商品名—Sevikar 5/40)舒脈康膜
衣錠
- 學名—Sacubitril 49 mg + Valsartan 51 mg(商品名—Entresto 100mg)健安心100
毫克膜衣錠
- 學名—Sacubitril 97 mg + Valsartan 103 mg(商品名—Entresto 200mg)健安心200
毫克膜衣錠

二、藥物作用

經由阻斷血管收縮素II在血管的作用，減少血管收縮，治療高血壓、充血性心衰竭。

三、正確服藥方法

遵照醫師指示服藥，空腹或飯後服用均可。

四、忘記吃藥怎麼辦

想起時儘快補吃一次劑量，若已經接近下次吃藥時間則不需補服藥品，避免同時使用兩次劑量而造成藥物過量。

五、藥物可能引起之副作用

低血壓、尿量改變、高血鉀、咳嗽、上呼吸道感染、腹瀉、頭痛、眩暈等，若症狀持續或嚴重，請告知醫師。

六、服藥注意事項

1. 藥物可能會使您感到暈眩，避免開車或操作機器。
2. 本藥不可用於懷孕婦女，婦女在使用本藥期間應做好避孕措施，若用藥期間懷疑自己可能懷孕了，應立刻告知醫師。
3. 即使沒有高血壓症狀，也不能擅自停藥，仍然應該按時服藥、定期測量血壓及回診檢查，同時遵照醫師指示做運動及飲食控制，才能確保血壓控制得宜。

七、儲存方式

保持藥物在原包裝或緊閉容器中，儲存於室溫下，遠離濕氣及陽光照射之處，並放置於兒童拿不到的地方。

參考資料

Aprovel 藥品說明書 2022 年 10 月 08 日

Micardis 藥品說明書 2021 年 11 月 23 日

Diovan 藥品說明書 2022 年 06 月 23 日

Edarbi 藥品說明書 2022 年 01 月 10 日

Co-Diovan 藥品說明書 2020 年 5 月 06 日

Exforge 藥品說明書 2022 年 06 月 23 日

Exforge HCT 藥品說明書 2023 年 02 月 08 日


Twynsta 藥品說明書 2020 年 09 月

Sevikar 藥品說明書 2021 年 6 月

Irbetan 藥品說明書 2021 年 12 月 20 日

Entresto 100mg/200mg 藥品說明書 2022 年 12 月 19 日

若您想對以上的內容進一步了解，請洽藥物諮詢專線：05-2756000 轉 3102

 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2023 年 05 月校閱